



HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH & LỒNG NGỰC VIỆT NAM
ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR AND THORACIC SURGERY OF VIETNAM




Tóm tắt các báo cáo

Abstract book

**ĐẠI HỘI PHẪU THUẬT TIM MẠCH
VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM
HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẦN THỨ 6**

*THE 6TH NATIONAL CONGRESS
OF ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR
& THORACIC SURGERY OF VIETNAM*



TP HỒ CHÍ MINH, NGÀY 9 - 11 THÁNG 6 NĂM 2016
Ho Chi Minh city, June 9th - 11th, 2016

Thứ bảy, ngày 11 tháng 06 năm 2016

9h35 – 9h45

Phòng họp: PEARL

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TUYẾN GIÁP QUA NGÃ NÁCH – 2 QUẲNG VÚ TRONG ĐIỀU TRỊ MICROCARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ

Nguyễn Văn Việt Thành

Bác sĩ khoa Lồng ngực – Mạch máu – Bướu cổ bệnh viện Bình Dân

Giảng viên bộ môn Ngoại trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi và an toàn của phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua ngã nách – 2 quầng vú trong điều trị microcarcinoma tuyến giáp dạng nhú. **Phương pháp:** Thiết kế nghiên cứu: báo cáo hàng loạt trường hợp (12 trường hợp). Microcarcinoma dạng nhú được định nghĩa là ung thư biểu mô tuyến giáp dạng nhú có kích thước đường kính của u nhỏ hơn 10mm. Chúng tôi tiến hành cắt trọn thùy giáp qua nội soi cho 12 trường hợp có chẩn đoán trước mổ là microcarcinoma tuyến giáp dạng nhú. **Kết quả:** 12 trường hợp được phẫu thuật thành công hoàn toàn qua nội soi, không có trường hợp nào chuyển mổ mở. Kích thước u trung bình (0.86 ± 0.11) cm. 10 trường hợp được cắt trọn 1 thùy tuyến giáp qua nội soi. 2 trường hợp được tiến hành cắt trọn thùy có u microcarcinoma dạng nhú và gần trọn thùy còn lại. Thời gian mổ trung bình là (60 ± 17) phút. Lượng máu mất trung bình là (10 ± 2) ml. Thời gian nằm viện sau mổ là (2 ± 1) ngày. 2 trường hợp tổn thương tạm thần kinh quặt ngược thành quản thoát qua và hồi phục khoảng 1 – 2 tháng sau mổ. 2 trường hợp tổn thương tuyến cận giáp thoát qua sau mổ. Không có bệnh nhân nào tụ dịch hoặc tổn thương khí quản sau mổ. Không có trường hợp tổn thương thần kinh thanh quản trên. Các biến chứng muộn khác như tê tay, tràn khí dưới da không xảy ra ở bất cứ trường hợp nào sau mổ. Với đường mổ qua thành ngực trước, tất cả bệnh nhân đều không có sẹo cổ và tất cả đều hài lòng về yếu tố thẩm mỹ. Tất cả bệnh nhân được theo dõi sau mổ với thời gian theo dõi từ 3 – 40 tháng. **Kết luận:** Phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua ngã nách – 2 quầng vú là một kỹ thuật an toàn và khả thi trong điều trị ung thư tuyến giáp dạng nhú giai đoạn sớm. Phương pháp điều trị này đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao nhưng về hiệu quả lâu dài, vẫn cần được tiếp nghiên cứu.

Từ khóa: microcarcinoma tuyến giáp dạng nhú, phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp